

SERVICIO DE PREVENCIÓN Área de Salud Laboral

Edificio Politécnico – Campus Externo 28871 Alcalá de Henares (Madrid) Teléfono de contacto: 91 885 6524 - 6527 servicio.prevencion@uah.es

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA ANTIGRIPAL VAXIGRIP® INDICADA PARA MENORES DE 60 AÑOS PARA LA CAMPAÑA 2025-2026

Imprescindible traer el día de la cita

NO DEBE RECIBIR VAXIGRIP:

Si usted es alérgico/a a:

 Los principios activos, o a cualquiera de los demás componentes de esta vacuna que pueden estar presentes en cantidades mínimas, como huevos (ovoalbúmina o proteínas de pollo), neomicina, formaldehído u octoxinol-9. Para más información consulte la ficha técnica en el siguiente enlace: Prospecto VAXIGRIP®

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Consulte a su enfermero antes de vacunarse si usted tiene:

- Una respuesta inmunológica debilitada (inmunodeficiencia o tratamiento con medicamentos que afecten al sistema inmunológico),
- Problemas de sangrado o se producen hematomas con facilidad.

Si usted tiene una enfermedad aguda con fiebre, la vacunación se debe posponer hasta que la fiebre haya desaparecido.

Antes o después de cualquier inyección, podría producirse un desmayo, por lo que debe informar a su enfermero si usted se ha desmayado en anteriores ocasiones tras la administración de una inyección.

REACCIONES ALÉRGICAS

Se pueden producir inmediatamente después de la administración de la vacuna y pueden ser amenazantes para la vida:

- Erupción cutánea, picor, dificultad para respirar, falta de aliento, hinchazón de la cara, labios, garganta, o lengua, presión arterial baja, frecuencia cardiaca rápida y pulso débil, piel fría y pegajosa, mareos, debilidad o desfallecimiento (reacción anafiláctica, angioedema, shock).
- Previamente a la vacunación, se habrá comprobado por parte del personal sanitario la fácil disponibilidad de tratamiento médico y supervisión adecuados en el caso raro de que se produjera una reacción anafiláctica (una reacción alérgica muy grave con síntomas como dificultad para respirar, mareos, pulso débil y rápido y erupción cutánea) después de la administración. Esta reacción puede presentarse con Vaxigrip, al igual que con todas las vacunas que se inyectan.

Otros síntomas pueden incluir:

 Zonas de picor, enrojecimiento, hinchazón y agrietamiento de la piel (dermatitis atópica), rubor, sofoco, sangre en la parte blanca del ojo (hiperemia ocular), enrojecimiento e irritación del ojo (conjuntivitis), irritación de garganta, dolor de garganta, irritación en el



SERVICIO DE PREVENCIÓN Área de Salud Laboral

Edificio Politécnico – Campus Externo 28871 Alcalá de Henares (Madrid) Teléfono de contacto: 91 885 6524 - 6527 servicio.prevencion@uah.es

interior de la nariz, goteo nasal, estornudos, congestión nasal, de los senos nasales o de la garganta, entumecimiento o sensación de pinchazos en la boca (parestesia oral), erupción en la boca (erupción de la mucosa oral), asma.

EFECTOS ADVERSOS

- Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):
 Dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general, dolor en el lugar de la inyección.
- Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):
 Fiebre (2), escalofríos, reacciones en el lugar de inyección: enrojecimiento (eritema), dureza (induración), hinchazón.
- Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): Hinchazón de los ganglios del cuello, la axila o la ingle, debilidad inusual, cansancio, somnolencia, mareos, aumento de la sudoración, dolor articular, diarrea, reacciones en el lugar de inyección: hematomas, picor, calor y malestar.

Para más información consulte la ficha técnica en el siguiente enlace: **Prospecto VAXIGRIP**®

Yo, D./Dña
con DNI CERTIFICO que he sido informado/a, he entendido y no
tengo dudas de la información recibida sobre la vacunación antigripal con la vacuna VAXIGRIP.
Así mismo, CONFIRMO no sufrir alergias medicamentosas, no haber sufrido ninguna reacción grave
en vacunaciones anteriores ni tampoco estar presentando sintomatología infecciosa alguna en el
momento actual.
Y declaro que ACEPTO la vacunación con la vacuna VAXIGRIP.
FECHA: FIRMA: